

Перечень лиц, подлежащих добровольному и обязательному  
тестированию на вирусные гепатиты В и С

**Виды тестирования на гемоконтактные вирусные гепатиты (ГВГ)**

**Добровольное тестирование** на ГВГ проводится конфиденциально с предоставлением информации о ГВГ перед тестированием и индивидуальным консультированием на основе результатов после тестирования. Добровольное тестирование на ГВГ в организациях здравоохранения могут пройти все желающие. Тестирование на ГВГ детей и подростков в возрасте до 18 лет и лиц, признанных в установленном законом порядке недееспособными, проводится с согласия их законных представителей, которые имеют право присутствовать при обследовании.

**Обязательное тестирование** на ГВГ также является добровольным, однако, при отказе от его проведения на человека могут быть наложены определенные ограничения.

Пациенты с ранее диагностированной хронической ВГВ-инфекцией, ВГС-инфекцией (в том числе с перенесенной ВГС-инфекцией) не подлежат скринингу на ГВГ (HBsAg и анти-HCV).

**Таблица 1. Лица, которым рекомендовано добровольное  
тестирование на ГВГ (HBsAg и анти-HCV)**

№	Категории обследуемых	Порядок обследования
1.	Беременные женщины	При взятии на учет по беременности
2.	Лица, имеющие бытовые и сексуальные контакты с больными острым и хроническим вирусным гепатитом В, циррозом и гепатоцеллюлярной карциномой в его исходе	Однократно (HBsAg), при выявлении больного в очаге, далее по эпидемиологическим показаниям
3.	Ключевые группы населения: лица, употребляющие инъекционные наркотики, секс-работники, мужчины, практикующие секс с мужчинами, трансгендерные люди	Один раз в 12 месяцев
4.	Лица, находящиеся в местах лишения свободы	Однократно, далее по эпидемиологическим показаниям
5.	Лица, не вакцинированные против вирусного гепатита В в рамках национального календаря прививок	Однократно (HBsAg)
6.	Младенцы, рожденные от HBsAg-положительных матерей	Однократно (HBsAg), в первые 48 часов жизни, далее по эпидемиологическим и клиническим показаниям



7.	Лица с повышенным уровнем АЛТ или АСТ, или с симптомами заболевания печени неясной этиологии	Однократно, далее по эпидемиологическим и клиническим показаниям
8.	Люди, живущие с ВИЧ	Однократно, далее по эпидемиологическим и клиническим показаниям
9.	Лица, обращающиеся за лечением ИППП	Однократно, далее по эпидемиологическим и клиническим показаниям
10.	Лица, нуждающиеся в иммуносупрессивной терапии, включая химиотерапию, иммуносупрессию, связанную с трансплантацией органов, и иммуносупрессию при ревматологических или гастроэнтерологических заболеваниях	Однократно, далее по эпидемиологическим и клиническим показаниям
11.	Лица, имевшие случайный непрофессиональный контакт с кровью и другими потенциально опасными биологическими жидкостями, в том числе пациенты, получающие постконтактную профилактику ВИЧ (ПКП)	Сразу после контакта, затем через 1, 3, 6 месяца после контакта
12.	Лица, являющиеся потенциальным источником инфекции после контакта с кровью или биологическими жидкостями	Однократно
13.	Пациенты, получающие доконтактную профилактику ВИЧ (ДКП)	До начала ДКП, далее каждые 12 месяцев
14.	Пациенты, получающие инвазивные и малоинвазивные процедуры (в том числе стоматологические)	Перед процедурой, далее по эпидемиологическим показаниям

**Таблица 2. Лица, которые подлежат обязательному тестированию на ГВГ (HBsAg и анти-HCV)**

№	Категории обследуемых	Порядок обследования
1.	Доноры крови, биологических жидкостей, органов и тканей	При каждой кровосдаче, перед трансплантацией
2.	Лица, получившие переливание крови и ее компонентов, получившие пересадку органов и тканей	Через 6 месяцев с момента последней трансфузии/ трансплантации, далее по эпидемиологическим показаниям
3.	Опекаемые лица и персонал закрытых социальных учреждений (детские дома, спец. интернаты, школы-интернаты, дома престарелых, приюты и др.)	При приеме на работу/поступлении, далее по клиническим и эпидемиологическим показаниям
4.	Потерпевшие и обвиняемые при судебно-медицинской экспертизе в случае сексуального насилия	При проведении экспертизы

5.	Медицинские работники, имеющие в процессе работы контакт с кровью, или проводящие любые парентеральные процедуры	При приеме на работу и далее 1 раз в год
6.	Лица с терминальной стадией почечной недостаточности, включая пациентов, находящихся на преддиализе, на гемодиализе, перитонеальном диализе и на домашнем диализе; пациенты с пожизненной гемотрансфузионной зависимостью (дисплазия, аплазия, гемобластоз, коагулопатия)	При первичном обращении и далее каждые 6 месяцев
7.	Персонал организаций, предоставляющих немедицинские инвазивные услуги (парикмахерские, услуги татуажа, пирсинга и другие косметологические услуги)	При приеме на работу, далее 1 раз в 12 месяцев
8.	Лица, имевшие случайный профессиональный контакт с кровью и другими потенциально опасными биологическими жидкостями, в том числе пациенты, получающие постконтактную профилактику ВИЧ (ПКП)	Сразу после контакта, затем через 1, 3, 6 месяца после контакта