

**Перечень лиц, подлежащих бесплатному лечению при вирусных гепатитах В и С
в приоритетном порядке**

1 группа (безотлагательное лечение):

- 1) Пациенты со значительным фиброзом или циррозом (по шкале METAVIR F2, F3 или F4), включая компенсированный (Чайлд-Пью А) и декомпенсированный (Чайлд-Пью В или С) цирроз печени.
- 2) Пациенты с декомпенсированным циррозом печени в исходе вирусного гепатита В без дельта-агента в листе ожидания на пересадку печени.
- 3) Пациенты с декомпенсированным циррозом печени в исходе вирусного гепатита С при MELD >20 в листе ожидания на пересадку печени.
- 4) Пациенты с декомпенсированным циррозом печени в исходе вирусного гепатита В с дельта-агентом в листе ожидания на пересадку печени при наличии ДНК вируса гепатита В.
- 5) Пациенты с клинически значимыми внепеченочными проявлениями (симптоматический васкулит, ассоциированный со связанной с вирусным гепатитом С криоглобулинемией, со связанной с иммунными комплексами ВГС нефропатией и не-Ходжкинской В-клеточной лимфомой).
- 6) Пациенты после трансплантации печени.
- 7) Беременные женщины, нуждающиеся в лечении вирусного гепатита В или в целях профилактики передачи ВГВ-инфекции вертикальным путём.

Критерии принадлежности пациента к 1 группе:

- 1) Данные лабораторного, инструментального обследования, подтверждающие диагноз в соответствии с клиническим руководством/клиническим протоколом.
- 2) Заключение врача ЦСМ/ЦОВП, врача центра по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и ВИЧ или врача стационара о наличии заболевания с полным клиническим диагнозом.

2 группа (риск стремительного развития заболевания печени из-за сопутствующих заболеваний или окружающих условий)

- 1) Коинфекция ВГВ и ВГС.
- 2) Онкологические заболевания.
- 3) Пациенты с длительной/пожизненной гемотрансфузионной зависимостью (например, коагулопатии).
- 4) ВИЧ-инфекция.
- 5) Туберкулёз (после завершения интенсивной фазы лечения, при отсутствии противопоказания для лечения вирусного гепатита).
- 6) Сахарный диабет 1 и 2 типов.
- 7) Бронхиальная астма, тяжёлое течение.
- 8) Рассеянный склероз.

- 9) Шизофрения.
- 10) Орфанные заболевания.
- 11) Пациенты после трансплантации органов.
- 12) Пациенты с хронической почечной недостаточностью, получающие услуги центров и отделений гемодиализа.
- 13) Лица с ограниченными возможностями здоровья.
- 14) Лица, находящиеся в местах лишения свободы.

Критерии принадлежности пациента к 2 группе:

- 1) Данные лабораторного, инструментального обследования, подтверждающие диагноз в соответствии с клиническим руководством/клиническим протоколом.
- 2) Заключение врача ЦСМ/ЦОВП, врача центра по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и ВИЧ, врача медицинского управления службы исполнения наказаний или врача стационара о наличии заболевания с полным клиническим диагнозом, включая наличие сопутствующего заболевания или состояния.
- 3) Документ, подтверждающий принадлежность пациента к группе лиц с ограниченными возможностями здоровья.

3 группа (социально уязвимые группы и лица с высоким риском передачи инфекции другим людям)

- 1) Медицинские работники, работа которых связана с нарушением целостности кожных покровов и слизистых оболочек.
- 2) Дети до 18 лет.
- 3) Лица пенсионного возраста.
- 4) Ключевые группы населения: лица, употребляющие инъекционные наркотики, секс-работники, мужчины, практикующие секс с мужчинами, трансгендерные люди.
- 5) Перечень категорий граждан, имеющих право на получение медико-санитарной помощи по ППГ бесплатно и на льготных условиях.

Критерии принадлежности пациента к 3 группе:

- 1) Данные лабораторного, инструментального обследования, подтверждающие диагноз в соответствии с клиническим руководством/клиническим протоколом.
- 2) Заключение врача ЦСМ/ЦОВП, врача центра по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и ВИЧ, врача медицинского управления службы исполнения наказаний или врача стационара о наличии заболевания с полным клиническим диагнозом.
- 3) Документ, подтверждающий принадлежность пациента к группе социально уязвимых лиц.

4 группа

Пациенты, нуждающиеся в лечении вирусного гепатита В или С (в соответствии с клиническим руководством/клиническим протоколом), не относящиеся к группам 1, 2, 3.